

Flori'Nat[®] pédiluve

Traitement des pattes en pédiluve sec

Composition

Complexe bactérien lyophilisé appartenant aux groupes des bactéries lactiques et des *Bacillus subtilis*.
Support nutritif (starter biologique)
Support: carbonate de calcium

Caractéristiques techniques

Complexe bactérien lyophilisé

- Multiplication rapide dès l'ensemencement

Poudre non compactable à utiliser en pédiluve sec

- Adhésion optimale des bactéries bénéfiques sur les sabots

Limite la prolifération des pathogènes sur les sabots et dans l'environnement



Mode d'emploi

EN PEDILUVE:

- > Remplir avec 8 à 10 cm de FLORI'NAT[®] PEDILUVE.
- > Faire passer les animaux dans le pédiluve selon les recommandations suivantes:
 - **Phase d'attaque:** 2 fois par jour pendant 5 à 7 jours consécutifs
 - **Phase d'entretien:** 2 fois par jour, 1 jour par semaine pendant 3 semaines consécutives
- > La phase d'entretien pourra ensuite être maintenue en permanence ou ce traitement d'un mois pourra être répété plusieurs fois dans l'année.
- > Consommation par passage:
 - Bovins: 200 g de FLORI'NAT[®] PEDILUVE par vache (selon type de pédiluve)
 - Caprins/ovins: environ 10 à 15 g de FLORI'NAT[®] PEDILUVE par chèvre/mouton

Il est recommandé d'utiliser un pédiluve anti-bouses, plus économe en FLORI'NAT[®] PEDILUVE.

EN TRAITEMENT DES LITIÈRES DE BOVINS

- > Epancre 100 à 300 g/logette par semaine
- > Epancre 300 à 400 g/vache sur litière paillée par semaine

Peut être utilisé en Agriculture biologique, conformément aux règlements (CE) N° 834/2007